

## Retentissement professionnel d'un lymphœdème du membre supérieur chez des femmes traitées pour cancer du sein

Auteurs : Locher F. <sup>(1)</sup>, Fau-Prudhomot P. <sup>(1)</sup>, Simon L. <sup>(2)</sup>, Sanchez-Bréchet M-L. <sup>(1)</sup>, Arrault-Chaya M. <sup>(2)</sup>, Vignes S. <sup>(2)</sup>

(1) Médecins du travail ACMS      (2) Praticiens hospitaliers service de lymphologie Hôpital Cognacq-Jay

- Le cancer du sein : 54000 femmes/an, le lymphœdème : 15 à 20 %
- Méthode : auto-questionnaire anonyme
- Résultats : sur 134 femmes,
  - . la gêne au mouvement importante dans 35% des cas, liée au niveau de manutention et corrélée à la modification observée des relations avec la hiérarchie ainsi qu'avec une perturbation du parcours professionnel,
  - . taux élevé de satisfaction envers les aménagements de postes (86%)

### Conclusion :

Impact professionnel certain d'un lymphœdème avec gêne fonctionnelle parfois importante, perturbation du parcours professionnel sans pour autant nécessiter un changement de poste; aménagements perçus comme très positifs bien qu'insuffisamment proposés; rôle éminent du médecin du travail et des ergonomes.