

Algorithme décisionnel - Allergie et vaccin COVID-19 (Pfizer)

ANNEXES

Tableau des critères cliniques d'anaphylaxie définis par Sampson H.A *et al.*

Une anaphylaxie est probable quand l'une de ces trois situations cliniques apparaît brutalement :

Situation 1	Installation aiguë d'une atteinte cutanéomuqueuse de type urticarienne ^a ET au moins un des éléments suivant : <ul style="list-style-type: none"> ▪ atteinte respiratoire^b ▪ hypotension artérielle ou signe de mauvaise perfusion d'organes^c
Situation 2	Au moins deux des éléments suivants apparaissant rapidement : <ul style="list-style-type: none"> ▪ atteinte cutanéomuqueuse^a ▪ atteinte respiratoire^b ▪ hypotension artérielle ou signes de mauvaise perfusion d'organes^c ▪ signes gastro-intestinaux persistants (douleurs abdominales, vomissements, etc.)
Situation 3	Hypotension artérielle : <ul style="list-style-type: none"> ▪ de 1 mois à 1 an, PAS < 70 mmHg ▪ de 1 à 10 ans, PAS < 70 + (2 × âge) mmHg ▪ de 11 à 17 ans, PAS < 90 mmHg ▪ adulte, PAS < 90 mmHg ou baisse de plus de 30% par rapport à sa valeur habituelle

PAS : pression artérielle systolique.

a Éruption généralisée, prurit, flush, œdème des lèvres, de la langue ou de la luette, etc.

b Dyspnée, bronchospasme, hypoxémie, stridor, diminution du débit expiratoire de pointe, etc.

c Syncope, collapsus, hypotonie