

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérogènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérogènes avec indication limitée chez l'homme.
Lèvre, Cavité buccale, Pharynx		
Lèvre		Rayonnement solaire. Hydrochlorothiazide.
Cavité buccale	Acétaldéhyde associé à la consommation de boissons alcoolisées. Boissons alcoolisées. Usage de tabac, qu'il soit ou non fumé. Chique de Bétel, avec ou sans tabac. HPV 16.	HPV 18. Exposition professionnelle aux bitumes durs et à leurs émissions pendant le travail de l'asphalte coulé. Exposition professionnelle aux bitumes oxydés et à leurs émissions pendant les travaux d'étanchéité.
Glandes salivaires	Rayons X et γ . Acétaldéhyde associé à la consommation de boissons alcoolisées.	lodes radioactifs, dont Iode ¹³¹ .
Pharynx, Oropharynx ^b	HPV 16.	
Pharynx, Amygdales ^b	HPV 16.	
Pharynx, Nasopharynx ^b	Poussière de bois. Formaldéhyde. Virus Epstein Barr. Poisson salé (méthode chinoise).	Légumes marinés (méthode asiatique).
Pharynx (tout site)	Acétaldéhyde associé à la consommation de boissons alcoolisées. Boissons alcoolisées. Chique de Bétel avec tabac. Usage de tabac fumé.	Amiante (toute forme). Exposition professionnelle aux bitumes durs et à leurs émissions pendant le travail de l'asphalte coulé. Exposition professionnelle aux bitumes oxydés et à leurs émissions pendant les travaux d'étanchéité. Consommation d'opium ⁽¹⁾ . Courant secondaire de la fumée de tabac.
Organes digestifs		
Œsophage	Rayons X et γ . Boissons alcoolisées. Acétaldéhyde associé à la consommation de boissons alcoolisées. Tabac fumé. Tabac prisé ou chiqué. Chique de Bétel avec ou sans tabac.	Exposition professionnelle aux bitumes durs et à leurs émissions pendant le travail de l'asphalte coulé. Exposition professionnelle aux bitumes oxydés et à leurs émissions pendant les travaux d'étanchéité. Nettoyage à sec. Industrie de fabrication du caoutchouc. Ingestion de boissons très chaudes ⁽²⁾ , (carcinome à cellules squameuses). Légumes marinés (méthode asiatique). Consommation d'opium ⁽¹⁾ .
Estomac	Rayons X et γ . Industrie de fabrication de caoutchouc. Tabac fumé. Infection par <i>Helicobacter pylori</i> .	Amiante (toute forme). Composés minéraux du plomb. Consommation de viandes transformées. Ingestion de nitrates ou nitrites dans des conditions favorisant la/..

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérigènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérigènes avec indication limitée chez l'homme.
Estomac (suite)		nitrosation endogène. Légumes marinés (méthode asiatique). Poisson salé (méthode chinoise). Consommation d'opium ⁽¹⁾ . Virus Epstein Barr. Fabrication de récipients en verre et de verre plat, verrerie d'art.
Colon	Rayons X et γ . Boissons alcoolisées. Consommation de viandes transformées. Tabac fumé.	Amiante (toute forme). Travail de nuit posté. Consommation de viandes rouges. Infection par <i>Schistosoma japonicum</i> .
Rectum	Boissons alcoolisées. Consommation de viandes transformées. Tabac fumé.	Amiante (toute forme). Travail de nuit posté. Consommation de viandes rouges. Infection par <i>Schistosoma japonicum</i> . Rayons X et γ .
Anus	Infection par HIV 1 . HPV 16.	HPV 18 et 33.
Foie	Plutonium. Aflatoxines. Chlorure de vinyle. Boissons alcoolisées. Tabac fumé (chez fumeurs et enfants de fumeurs). Infection chronique par VHB. Infection chronique par VHC. Thorium ²³² et produits de filiation. Contraceptifs oraux OP combinés.	Rayons X et γ . Arsenic et composés inorganiques de l'arsenic. DDT (4,4'-dichlorodiphényltrichloréthane). Trichloréthylène. Chique de bétel sans tabac. Infection par HIV 1. Infection par <i>Schistosoma japonicum</i> . Stéroïdes androgéniques anabolisants.
Voies biliaires	Plutonium. Thorium ²³² et produits de filiation. 1,2-dichloropropane. Infection par <i>Clonorchis sinensis</i> . Infection par <i>Opisthorchis viverrini</i> . Tabac fumé (chez les fumeurs).	Rayons X et γ . Arsenic et composés inorganiques de l'arsenic. DDT (4,4'-dichlorodiphényltrichloréthane). Trichloréthylène. Dichlorométhane (chlorure de méthylène). Chique de bétel sans tabac. Infection par <i>Schistosoma japonicum</i> . Infection chronique par VHB. Infection chronique par VHC. Stéroïdes androgéniques anabolisants.
Vésicule biliaire	Thorium ²³² et produits de filiation.	
Pancréas	Tabac, fumé ou non.	Rayons X et γ . Boissons alcoolisées. Consommation de viandes rouges. Consommation d'opium ⁽¹⁾ . Thorium ²³² et produits de filiation.

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérogènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérogènes avec indication limitée chez l'homme.
Autre site du tube digestif		Radio-iodes dont Iode ¹³¹ .
Organes respiratoires et intrathoraciques		
Cavité nasale et sinus paranasaux	Radium ²²⁶ , Radium ²²⁸ et leurs produits de filiation. Poussière de bois. Poussière de cuir. Composés du nickel. Production d'isopropanol par un procédé aux acides forts. Tabac fumé.	Composés du Chrome 6. Formaldéhyde. Travail en fabrication de textiles. Métiers de charpentier et de menuisier.
Larynx	Brouillards d'acides forts minéraux. Amiante (toute forme). Boissons alcoolisées. Acétaldéhyde associé à la consommation de boissons alcoolisées. Tabac fumé. Consommation d'Opium. ⁽¹⁾	Exposition professionnelle aux bitumes durs et à leurs émissions pendant le travail de l'asphalte coulé. Exposition professionnelle aux bitumes oxydés et à leurs émissions pendant les travaux d'étanchéité. Industrie de fabrication de caoutchouc. Courant secondaire de la fumée de tabac. HPV 16 et 18. Moutarde soufrée.
Poumon	Rayons X et γ . Plutonium. Radon ²²² et ses produits de filiation. Expositions professionnelles encourues lors du procédé Acheson. ⁽³⁾ Primo-métallurgie de l'aluminium. Arsenic et composés minéraux. Amiante (toute forme). Béryllium et composés. Bischlorométhyléther et éther chlorométhylméthylque technique. Cadmium et composés. Composés du Chrome 6. Gazéification du charbon. Brai de houille. Fabrication du coke. Fumées d'échappement de moteurs diesel. Mines souterraines d'hématite Fe ₂ O ₃ . Expositions professionnelles en fonderies de fer et d'acier. Composés du nickel. Expositions encourues lors du métier de peintre. Industrie de fabrication du caoutchouc. Inhalation de silice cristalline pulvérulente (quartz ou cristobalite). Suies (concerne les expositions professionnelles des ramoneurs).	Brouillards d'acides forts minéraux. Fabrication de récipients en verre et de verre plat, verrerie d'art. Benzène. Fabrication d'électrodes de carbone. Expositions combinées aux toluènes alpha chlorés ⁽⁴⁾ (CAS 98-07-7, 100-44-7, 98-87-3) et au CAS 98-88-4 . Coexposition au cobalt métallique et au carbure de tungstène. Créosotes. Application et/ou pulvérisation professionnelles d'insecticides non arsenicaux. Expositions professionnelles encourues lors de procédés d'impression. Diazinon. Expositions professionnelles aux bitumes oxydés et à leurs émissions en travaux d'étanchéité. Expositions professionnelles aux bitumes durs et à leurs émissions durant le travail de l'asphalte coulé. Fibres de carbure de silicium. Emission dues à la friture à haute température.

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérogènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérogènes avec indication limitée chez l'homme.
Poumon (suite)	<p>Fumées de soudage.</p> <p>Fumées de combustion de charbon (en intérieur).</p> <p>Pollution atmosphérique extérieure et contenu particulaire de cette pollution.</p> <p>Tabac fumé.</p> <p>Courant secondaire de la fumée de tabac.</p> <p>Consommation d'Opium⁽¹⁾.</p> <p>Protocole MOPP et autres chimiothérapies comprenant des agents alkylants.</p> <p>Moutarde soufrée.</p>	<p>Hydrazine</p> <p>2,3,7,8,-TCDD (dioxine de Seveso)⁽⁵⁾.</p> <p>..../..</p> <p>Fumées de combustion de végétaux (essentiellement de bois), en intérieur.</p>
Tractus aéro-digestif supérieur		
VADS (cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage)	<p>Acétaldéhyde associé à la consommation de boissons alcoolisées (VADS hautes).</p> <p>Boissons alcoolisées.</p> <p>Tabac fumé.</p>	<p>Exposition professionnelle aux bitumes durs et à leurs émissions pendant le travail de l'asphalte coulé.</p> <p>Exposition professionnelle aux bitumes oxydés et à leurs émissions pendant les travaux d'étanchéité.</p>
Os		
Os	<p>Rayons X et γ.</p> <p>Plutonium.</p> <p>Radium²²⁴ et ses produits de filiation.</p> <p>Radium²²⁶ et ses produits de filiation.</p> <p>Radium²²⁸ et ses produits de filiation.</p>	Radio-iodes dont Iode ¹³¹ .
Peau		
Mélanome cutané	<p>PCBs.</p> <p>Rayonnement solaire.</p> <p>Appareil de bronzage aux UV.</p>	Expositions professionnelles encourues dans le raffinage du pétrole.

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérogènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérogènes avec indication limitée chez l'homme.
Autres formes de cancer de la peau	<p>Rayons X et γ.</p> <p>Arsenic et composés minéraux.</p> <p>Distillation du goudron de houille.</p> <p>Huiles minérales non ou peu raffinées.</p> <p>Huiles de schiste.</p> <p>Suies (concerne les expositions professionnelles des ramoneurs).</p> <p>Rayonnement solaire.</p> <p>Méthoxalène (8-méthoxypsoralène) associé aux UVA.</p> <p>Cyclosporine.</p> <p>Azathioprine.</p>	<p>Créosotes.</p> <p>Expositions professionnelles encourues dans le raffinage du pétrole.</p> <p>Appareils de bronzage aux UV.</p> <p>Infection par HIV 1.</p> <p>Infection par HPV 5 et 8 chez patients atteints d'épidermodysplasie verruciforme.</p> <p>MCV (virus du carcinome de Merkel).</p> <p>Moutarde azotée.</p> <p>Hydrochlorothiazide.</p>
Mésothélium, endothélium et tissu mou		
Mésothélium (plèvre ,péritoine et autres)	<p>Amiante (toute forme).</p> <p>Erionite.</p> <p>Fluoroédénite amphibole fibreuse.</p> <p>Expositions professionnelles encourues lors du métier de peintre.</p>	
Endothélium (sarcome de kaposi)	<p>Infection par HIV 1.</p> <p>Herpès virus du sarcome de Kaposi.</p>	
Tissu mou		<p>Radio-iodes dont Iode¹³¹.</p> <p>Expositions combinées aux polychlorophénols et à leurs sels sodiques.</p> <p>2,3,7,8,-TCDD (dioxine de Seveso)⁽⁵⁾.</p>
Sein		
Sein	<p>Rayons X et γ.</p> <p>Boissons alcoolisées.</p> <p>Traitement substitutif OP combiné de la ménopause.</p> <p>Contraceptifs oraux OP combinés.</p> <p>Diéthylstilbestrol (DES).</p>	<p>Travail de nuit posté.</p> <p>Oxyde d'éthylène.</p> <p>PCBs.</p> <p>Dieldrine et aldrine métabolisée en dieldrine.</p> <p>Tabac fumé.</p> <p>Traitement oestrogénique de la ménopause.</p> <p>Digoxine.</p>
Organes génitaux féminins		
Vulve	<p>HPV 16.</p>	<p>Infection par HIV 1,</p> <p>HPV 18 et 33.</p>
Vagin	<p>HPV 16.</p> <p>Exposition in utero au Diéthylstilbestrol (DES).</p>	<p>Infection par HIV 1.</p>
Col utérin	<p>Exposition in utero au Diéthylstilbestrol (DES).</p> <p>Contraceptifs OP oraux combinés.</p> <p>Tabac Fumé.</p> <p>HPV 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59.</p>	<p>HPV 26, 53, 66, 67, 68, 70, 73, 82.</p>

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérigènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérigènes avec indication limitée chez l'homme.
	Infection par HIV 1.	
Endomètre	Traitement oestrogénique de la ménopause. Traitement OP combiné de la ménopause. Tamoxifène.	Diéthylstilbestrol (DES).
Ovaire	Amiante (toute forme). Tabac fumé. Traitement oestrogénique de la ménopause.	Rayons X et γ . Usage périnéal de talc en poudre.
Organes génitaux masculins		
Pénis	HPV 16.	Infection par HIV 1. HPV 18.
Prostate ⁽⁶⁾		Rayons X et γ . Industrie de fabrication du caoutchouc. Cadmium et composés. Arsenic et dérivés minéraux. Malathion. Travail de nuit posté. Expositions professionnelles encourues lors du métier de sapeur-pompier. Consommation de viandes rouges. Thorium ²³² et produits de filiation. Stéroïdes androgéniques anabolisants.
Testicule		Exposition in utero au Diéthylstilbestrol (DES). Expositions professionnelles encourues lors du métier de sapeur-pompier. Acide perfluorooctanoïque (PFOA) DDT (4,4'-dichlorodiphényltrichloréthane). N-N diméthylformamide.
Tractus urinaire		
Rein	Rayons X et γ . Trichloréthylène. Tabac fumé.	Arsenic et composés minéraux. Cadmium et composés du cadmium. Acide perfluorooctanoïque (PFOA). Fumées de soudage.
Bassinets et uretère	Tabac fumé. Plantes contenant de l'acide aristolochique. Phénacétine et analgésiques en contenant.	Acide aristolochique.
Vessie	Rayons X et γ . Primo métallurgie de l'aluminium. 4-aminobiphényle. Arsenic et composés inorganiques. Fabrication d'auramine.	4, chloro-ortho-toluidine. Brai de houille. Tetrachloréthylène (Perchloréthylène). Expositions professionnelles encourues lors du nettoyage à sec.

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérogènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérogènes avec indication limitée chez l'homme.
Vessie (suite)	Benzidine. Fabrication de Magenta. 2-naphtylamine. Ortho-toluidine. Expositions professionnelles encourues lors du métier de peintre. Industrie de fabrication de caoutchouc. Tabac fumé. Consommation d'Opium ⁽¹⁾ . Infection par <i>Schistosoma haematobium</i> . Chlornaphazine. Cyclophosphamide.	Fumées d'échappement diesel. Expositions professionnelles/.. encourues lors du métier de coiffeur ou barbier. Expositions professionnelles encourues lors des procédés d'impression. Suies (concerne les expositions professionnelles des ramoneurs). Travail en fabrication de textiles. 2 Mercaptobenzothiazole. Pollution atmosphérique extérieure. Pioglitazone.
Œil, cerveau, système nerveux central		
Œil	UV émis par le soudage. Appareils de bronzage à UV. Infection par HIV 1.	Rayonnement solaire.
Cerveau et SNC	Rayons X et γ .	Champs électromagnétiques Radio-Fréquence ⁽⁷⁾ (Gliome et neurinome acoustique).
Glandes endocrines		
Thyroïde	Rayons X et γ . Radio-iodes dont Iode ¹³¹ .	
Tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et corrélés^c		
Leucémie de l'enfance		
Leucémie lymphocytaire aigüe de l'enfance ^d		Tabagisme parental.
Leucémie myéloïde aigüe de l'enfance ^d		Tabagisme parental. Benzène. Téniposide.
Toute forme de leucémie de l'enfance	Thorium ²³² et produits de filiation. Produits de fission dont le strontium ⁹⁰ . Rayons X et γ .	Chloramphénicol. Champs magnétiques ELF (extrêmement basses fréquences). Radio-iodes dont Iode ¹³¹ . Expositions professionnelles de la mère encourues lors de son métier de peintre. Tabagisme parental.
Leucémie⁽⁸⁾		
Leucémie myéloïde aigüe ^e	Rayons X et γ . Benzène. Formaldéhyde. Tabac fumé. Phosphore ³² (comme phosphore). Thorium ²³² et produits de filiation.	Bischloroéthyl nitrosourée (BCNU). Etoposide. Mitoxantrone. Téniposide.

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérigènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérigènes avec indication limitée chez l'homme.
Leucémie myéloïde aigüe ^e (suite)	Tréosulfan. Sémustine [1-(2-chloroéthyl)-3-(4-méthylcyclohexyl)-1-nitrosourée, méthyl-CCNU]. Protocole MOPP et autres chimiothérapies comprenant des agents alkylants. Melphalan. Etoposide avec cisplatine et bléomycine. Cyclophosphamide. Chlorambucil. Busulfan.	../..
Autres leucémies aigües non lymphocytaires ^e	Benzène. Formaldehyde. Phosphore ³² (comme phosphore). Rayons X et γ . Thorium ²³² et ses produits de filiation.	Bischloroéthyl nitrosourée (BCNU).
Leucémie myéloïde chronique ^e	Formaldehyde. Rayons X et γ . Tabac fumé. Thorium ²³² et ses produits de filiation.	Benzène.
Leucémie lymphoïde aigüe ^e	Phosphore ³² (comme phosphore). Thorium ²³² et ses produits de filiation. Rayons X et γ .	
Leucémie lymphoïde chronique ^e		Benzène. Oxyde d'éthylène.
Leucémie / Lymphome à cellules T de l'adulte (ATLL) ^e	Virus T lymphotrope humain type 1 (HTLV 1). Thorium ²³² et ses produits de filiation. Rayons X et γ .	
Leucémie de l'adulte (toute forme)	1,3-Butadiène. Industrie de fabrication de caoutchouc. Produits de fission dont le Strontium ⁹⁰ . Thiotépa.	Chloramphénicol. Diazinon. Moutarde azotée. Expositions professionnelles encourues lors du raffinage du pétrole. Styrène. Radio-iodes dont iode ¹³¹ . Radon ²²² et ses produits de filiation.
Lymphome		
Lymphome de Hodgkin ^f	Virus Epstein-Barr. Infection par VIH type 1.	
Lymphome primaire des séreuses ^f	Herpès virus du sarcome de Kaposi.	
Lymphome non hodgkinien : lymphome en relation avec une immuno-suppression ^{f,g}	Virus Epstein-Barr.	
Lymphome non hodgkinien : lymphome de Burkitt ^{f,g}	Virus Epstein-Barr.	Paludisme (causé par une infection à plasmodium falciparum dans les zones holo endémiques).

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérogènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérogènes avec indication limitée chez l'homme.
Lymphome non hodgkinien : lymphome extra-ganglionnaire à cellules NK/T (type nasal) ^{f,g}	Virus Epstein-Barr.	
Lymphome non hodgkinien : lymphome de bas grade à cellules B du tissu lymphoïde associé à la muqueuse gastrique (MALT) ^{f,g}	Infection par <i>Helicobacter pylori</i> .	
Lymphome non hodgkinien (tout type) ^f	Azathioprine. Cyclosporine. Infection chronique par VHC. Infection par VIH type 1. Lindane. Pentachlorophénol.	Benzène. Herbicides chlorophénoxy. DDT (4,4'-dichlorodiphényltrichloréthane). Diazinon. Dichlorométhane (chlorure de méthylène). Oxyde d'éthylène. Glyphosate (et sels de). Malathion. Exposition aux polychlorophénols et/ou leurs sels sodiques. Expositions encourues lors du métier de sapeur-pompier. Trichloréthylène. PCBs. 2,3,7,8 TCDD ⁽⁵⁾ . Infection chronique par VHB. Rayons X et γ .
Maladie multicentrique de Castleman ^f		Herpès virus du sarcome de Kaposi.
Lymphome (tout type)	1,3 Butadiène. Industrie de fabrication du caoutchouc.	Styrène.
Myélome multiple		
Myélome multiple	1,3 Butadiène. Pentachlorophénol.	Benzène. Oxyde d'éthylène. Styrène. 1,1,1-Trichloroéthane. Rayons X et γ .
Sites multiples, ou sites non spécifiés		
Carcinome de type lympho-épithéliome (LELC)		Virus Epstein-Barr.
Sites multiples (non spécifiés)	Cyclosporine. Produits de fission dont le Strontium ⁹⁰ . Expositions in utero aux Rayons X et γ .	Herbicides Chlorophénoxy.
Tous les sites	2, 3, 7, 8 TCDD (dioxine de Seveso). ⁽⁵⁾	
b Voir aussi pharynx (tout site)		
c Pour des raisons historiques, la leucémie lymphoïde chronique a été incluse dans les leucémies, plutôt que comme lymphome CLL à petits lymphocytes avec lymphomes non hodgkiniens		
d Voir aussi leucémie de l'enfance (toute forme)		

(a) Ce document ne comprend pas les facteurs qui ne sont pas pris en compte par les monographies du CIRC, notamment particularité génétique, statut reproductif et quelques facteurs alimentaires.

Liste des classifications par sites de cancer, avec indication suffisante ou limitée chez l'homme, d'après les monographies CIRC (volumes 1 à 130) (a).

Traduction Bernard Fontaine 22 mars 2022 (annule et remplace la version de janvier 2022) : ce document ne saurait être considéré comme une publication officielle du CIRC ou de l'OMS. bfontaine_ext@polesantetravail.fr

Site de cancer	Agents cancérigènes avec indication suffisante chez l'homme	Agents cancérigènes avec indication limitée chez l'homme.
e Voir aussi leucémie (toute forme) f Voir aussi lymphome (tout type) g Voir aussi lymphome non hodgkinien (tout type)		
D'après la dernière mise à jour sur le site du CIRC 8 décembre 2021 adaptée du tableau 4 de l'article de Coglianò et coll * et complétée de nouvelles informations issues des évaluations des monographies plus récentes et d'une description plus complète des indications pour les cancers des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et corrélés. (* Version 2011 disponible sur : http://jnci.oxfordjournals.org/content/early/2011/12/11/jnci.djr483.short?rss=1)		

Notes du traducteur :

- (1) Opium : Ne concerne pas l'héroïne, la morphine, la codéine et les opioïdes synthétiques (e.g Fentanyl®)
- (2) Boissons très chaudes : > 65°C
- (3) Procédé Acheson : concerne la fabrication du carbure de silicium
- (4) Au vu de l'extrême similitude entre les noms des divers composés en traduction française, seuls les numéros CAS correspondants aux noms anglais ont été indiqués
- (5) TCDD : voir également cancers tout site en fin de liste
- (6) Prostate : à noter la sortie du tableau de maladies professionnelles 61 pour le régime agricole. Décret du 22/12/2021 relatif à l'exposition professionnelle aux pesticides.
- (7) Radiofréquences (300 kHz à 300 GHz), y compris les fréquences des téléphones sans fil.
- (8) Leucémie de l'âge adulte

Légende des couleurs utilisées :

- Rouge** : expositions professionnelles
Bleu : habitudes liées au mode de vie
Orange : médicaments
Vert : agents infectieux
Violet : agents physiques

Et tous nos remerciements aux Drs C. Nisse et E. Loeuillet pour leur relecture bienveillante et à V Descamps pour la finalisation du document.